

# キイトルーダ®と化学療法±ペバシズマブの併用治療 治療の注意点③

治療中に以下のような症状や気になる体調の変化、  
困ったことなどがあれば、  
すぐに医師や看護師、薬剤師にご相談ください

\* パクリタキセルおよびシスプラチンまたはカルボプラチン

## キイトルーダ®と化学療法\*±ペバシズマブの副作用として予測される症状



- 見え方の異常
- まぶたが重い・顔の筋肉が動きにくくなる



- 頭痛
- 意識がうすれる
- めまい
- 脱毛
- 耳鳴り



- 口の中や喉が渇きやすい・多飲
- 歯ぐきや口内の出血
- 口内炎
- 鼻血
- くしゃみ
- くちびるのただれ
- 声のかすれ
- 喉の痛み



- 吐き気やおう吐
- 食欲不振




- 咳
- たん・血たん
- 息切れ・呼吸困難・動悸
- 胸の痛み



- 下痢
- ネバネバした便・血便
- 便秘
- 腹痛
- トイレに近い
- 血尿
- 尿量の減少
- 尿の泡立ち



- 手足に力が入らない
- 手指のふるえ



- |             |             |        |              |
|-------------|-------------|--------|--------------|
| ● 発熱        | ● 発疹などの皮膚症状 | ● むくみ  | ● 体重減少       |
| ● 寒気        | ● あおあざができる  | ● けいれん | ● しびれ        |
| ● 疲れやすい・だるい | ● 出血が止まりにくい | ● 高血圧  | ● 関節・筋肉の痛み   |
| ● 黄疸        | ● 体重増加      | ● 低血圧  | ● 傷の治りが遅くなる† |

† : ペバシズマブでのみ予測される症状

キイトルーダ®, パクリタキセル, シスプラチン, カルボプラチン, ペバシズマブの患者向医薬品ガイドおよび電子添文

記載の症状やその他気になる体調の変化がある場合は、すぐに医師や看護師、薬剤師にご連絡ください。

