

# キイトルーダ®と化学療法の併用療法の注意点③

## まとめ キイトルーダ®の副作用として予測される症状


**頭痛** 下垂体機能障害、脳炎・髄膜炎など  
**意識がうすれる** 1型糖尿病、脳炎・髄膜炎など

**見え方の異常** ぶどう膜炎  
**まぶたが重い・顔の筋肉が動きにくくなる** 重症筋無力症

**口の中や喉が渇きやすい・多飲** 1型糖尿病  
**歯ぐきや口内の出血** 免疫性血小板減少性紫斑病、血球貪食症候群  
**くしゃみ** 点滴時の過敏症反応  
**声のかすれ** 甲状腺機能障害など  
**くちびるのただれ** 重度の皮膚障害

**咳** 間質性肺疾患、心筋炎、結核  
**たん・血たん** 結核  
**息切れ・呼吸困難** 間質性肺疾患、ギラン・バレー症候群、重症筋無力症、点滴時の過敏症反応、心筋炎、溶血性貧血、赤芽球癆など  
**胸の痛み** 心筋炎

**吐き気やおう吐** 大腸炎・小腸炎、副腎機能障害、脳炎・髄膜炎、1型糖尿病、重度の胃炎など  
**食欲不振** 劇症肝炎・肝不全・肝機能障害・肝炎、下垂体機能障害、副腎機能障害、重度の胃炎など



**下痢** 大腸炎・小腸炎など  
**ネバネバした便・血便** 大腸炎・小腸炎  
**便秘** 甲状腺機能障害、副腎機能障害、脊髄炎  
**腹痛** 大腸炎・小腸炎、脾炎、1型糖尿病、硬化性胆管炎  
**トイレが近い** 1型糖尿病  
**血尿** 腎機能障害、免疫性血小板減少性紫斑病  
**尿量の減少・尿が出にくい** 腎機能障害、脊髄炎

**手足に力が入らない** ギラン・バレー症候群、筋炎・横紋筋融解症、重症筋無力症、脊髄炎  
**手指のふるえ** 甲状腺機能障害など

### 全身

**発熱** 間質性肺疾患、大腸炎・小腸炎、腎機能障害、重度の皮膚障害、心筋炎、脳炎・髄膜炎、無顆粒球症、血球貪食症候群、結核など  
**疲れやすい・だるい** 大腸炎・小腸炎、劇症肝炎・肝不全・肝機能障害・肝炎、甲状腺機能障害、副腎機能障害、結核など  
**黄疸** 劇症肝炎・肝不全・肝機能障害・肝炎・硬化性胆管炎、脾炎、溶血性貧血  
**発疹などの皮膚症状** 点滴時の過敏症反応、重度の皮膚障害、免疫性血小板減少性紫斑病、硬化性胆管炎、血球貪食症候群など  
**体重の減少** 副腎機能障害、1型糖尿病、結核など  
**体重の増加** 甲状腺機能障害、腎機能障害  
**むくみ** 甲状腺機能障害、腎機能障害、心筋炎  
**けいれん** 脳炎・髄膜炎、血球貪食症候群  
**しびれ** ギラン・バレー症候群

記載の症状やその他気になる体調の変化がある場合は、すぐに医師や看護師、薬剤師にご連絡ください

